



Ptačí hodinka

Výsledky 2026

S kosem černým jsme se letos setkali stejně často jako se sýkorou modřinkou. V žebříčku se tak stal druhým nejčastěji pozorovaným druhem. Tím se trojice nejčastějších druhů pozorovaných při Ptačí hodině proměnila poprvé od roku 2019, kdy program sčítání ptáků nejen na krmítkách v Česku začal.



Gabriela Uhravová: kos černý

Do osmého ročníku Ptačí hodinky se zapojilo téměř **40 000 lidí**, kteří si od **9.–11. ledna** našli hodinu času a zaznamenali všechny ptáky, které za hodinu z jednoho místa viděli. V rámci **28 000 hodinových sčítání** to bylo více než **800 000 ptáků!** Ptáky jsme sledovali a sčítali na zahradách, v parcích, lesích, u řek, ve velkoměstech stejně jako v menších obcích, na sídlištích nebo v zahradních čtvrtích, ale i uprostřed přírody. Pro spolehlivé vyhodnocení výsledků, jak se zimujícím ptákům u nás daří a jaké prostředí využívají, je důležité sčítat dlouhodobě. **Děkujeme všem, kteří se do Ptačí hodinky zapojili.**

Program občanské vědy Ptačí hodinka připravuje Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 34, 150 00
Praha 5, www.birdlife.cz



ČSO · Společně pro ptáky
a pro lidi. Už 100 let.

Sčítání 2027

Na 9. ročník
Ptačí hodinky
se můžete těšit

8.–10. ledna.



Ptáci kolem nás

Nejčastěji pozorované druhy

			v procentu sčítání*	průměrný počet**	celkový počet
1.		sýkora koňadra	89,5	6,4	156 680
2.		kos černý	70,9	2,7	52 655
3.		sýkora modřinka	69,9	3,6	68 992
4.		vrabec polní	43,9	10,5	126 507
5.		strakapoud velký	41,8	1,5	17 216
6.		hrdlička zahradní	40,3	3,6	39 678
7.		vrabec domácí	38,3	10,2	107 968
8.		červenka obecná	37,8	1,3	13 617
9.		brhlík lesní	37,5	1,7	17 243
10.		pěnkava obecná	32,5	2,9	25 782
11.		straka obecná	28,9	2,2	17 593
12.		zvonek zelený	22,3	4,0	24 703
13.		sojka obecná	20,2	1,7	9 237
14.		stehlík obecný	17,7	7,9	38 466
15.		dlask tlustozobý	16,4	2,2	9 879

* V procentu sčítání: Frekvence výskytu. Udává, jak často byl druh zaznamenán. Například frekvence 25 % znamená, že druh byl zjištěn na čtvrtině sčítacích míst.
** Průměrný počet: Kolik jedinců bylo průměrně pozorováno, byl-li druh spatřen. Procentuální změny jsou v poměru ke sčítání uskutečněnému v roce 2025.

Výsledky zahrnují pouze sčítání z 9.–11. ledna 2026. Velmi nepravděpodobná pozorování a sčítání nedodržující metodiku byla ze zpracování vyřazena.

+5–9 % ±0–4 % -5–9 % <-10 %

Nejpočetnější druhy Ptačí hodinky

Kresby: Mike Langman (rspb-images.com)



sýkora koňadra 156 680



vrabec polní 126 507



vrabec domácí 107 968



Žebříček nejpočetnějších druhů i poosmé v řadě zůstává stejný. Druhou a třetí příčku tradičně obsazují vrabec polní a domácí. Na rozdíl od kosa černého nebo sýkory modřinky jsme je sice neviděli tak často, když už se ale objevili, bylo to zpravidla ve větším hejnu – u obou druhů vrabců to bylo průměrně 10 jedinců.

Kosy černé jsme letos pozorovali nejen častěji, ale zaznamenali jsme i více jedinců než v loňském roce. Musíme mít však na paměti, že počty ptáků jsou závislé na počtu zapojených lidí. A čím víc nás sčítá, tím více ptáků (zpravidla) vidíme.


Četnost výskytu kosa černého se střídá pravidelně, a tedy po loňském poklesu jsme pro letošní ročník předpokládali opět častější výskyt – a to se potvrdilo. To platí mimo jiné i pro další lesní druhy, jako je **pěnkava obecná**, **strakapoud velký** nebo **sojka obecná**. I s těmi jsme se setkali letos častěji.

Kos černý je krásný příklad toho, co z dat Ptačí hodinky můžeme zjistit. V letech, kdy je jeho výskyt méně častý, se s ním na jihu Česka setkáme zhruba na třetině sčítacích míst, zatímco na severu asi dvakrát častěji. V letech s četnějším výskytem jej ale i na jihu Česka pozorujeme při každém druhém sčítání (1).

Tyto „geografické gradienty“ v rozšíření ptáků nejsou jen specialitou kosa černého. Velmi zajímavý je výskyt **straky obecné**. Tu jsme sice pozorovali stejně často jako loni (byť se do desítky nejčastějších druhů nedostala), významné rozdíly jsou však mezi jižní Moravou a severozápadními Čechami. Zjednodušeně můžeme říct, že pozorovat straku obecnou během Ptačí hodinky na jižní Moravě je docela ojedinělé. Na západě Čech nebo v Praze se naopak objeví na polovině sčítacích míst.


Smutný příběh pokračuje u **zvonka zeleného** (2). U něho sice nezaznamenáváme výrazné změny ve frekvenci výskytu a na první pohled bychom si mohli oddechnout, že výrazně neubývá. Právě zde ale můžeme vidět, proč je tak důležité sčítat dlouhodobě. Již od počátku Ptačí hodinky vidíme, že se zvonek stává čím dál vzácnější. Úbytek zvonků začal však mnohem dříve – trvá již několik desítek let, a to jak u nás, tak i jinde v Evropě. Na vině je trichomonóza, která se přenáší právě na krmítkách. Udržujeme proto pítka, krmítka i prostor pod ním čistý. Pokud se setkáme s nemocným ptákem, okamžitě přikrmování přerušíme. [Přečtěte si o chorobách více](#). O tom, jaká rizika přikrmování přináší a jak přikrmovat zodpovědně, se dozvíte v [pozičním dokumentu](#) na webu ČSO.

(1) Četnost výskytu kosa černého



(2) Změny v četnosti výskytu zvonka zeleného, kosa černého a sýkory modřinky

Ačkoli se sýkora modřinka poprvé od roku 2019 umístila na třetím místě, neznamená to, že ubývá. Zvonek však v četnosti výskytu poklesl téměř o 10 %.



Podrobné výsledky včetně map najdete na ptacihodinka.cz.